



ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271

Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO

Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

NR. 3334 din 14.06.2015

Revizia
Exemplarul

PROTOCOL CU GRAFIC DE CRESTERE LA COPII

Dezvoltarea normala a copilului e preocuparea de baza a parintilor .Dezvoltarea fizica e importanta mai ales in primii ani de viata , prin aceasta medical pediateru isi da seama , inca de la nastere, daca copilul e in perimetrui normali .

Important e ca dezvoltarea sa fie continua . De aceea masurarea copilului trebuie sa se fac la anumite intervale de timp pentru a se observa daca apar discontinuitati.Intervalele de masurare se raresc pe masura ce copilul creste.

Pana la varsta de 3 ani , copilul este masurat in lungime in pozitia culcat, iar dupa aceasta varsta se va masura in pozitia stand in picioare.

Greutatea normala a unui nou- nascut se situeaza in intervalul 2,6-4,3 kg cu o medie de 3,2 kg.Aceste cifre sunt orientative si prezinta variatii importante chiar si intre frati si surori.

In primele 3 luni , bebelusul creste cu 25- 30 g / zi , adica 800 g-1 kg in medie pe luna , dupa care luarea in greutate diminueaza progresiv.

De regula , greutatea la nastere a bebelusului:

- se dubleaza la 5 luni
- se tripleaza la 1 an
- se mareste de 4 ori la 2 ani

CREȘTEREA ZILNICĂ ÎN GREUTATE

VARSTA	CREȘTEREA ZILNICĂ ÎN GREUTATE
PRIMELE 3 LUNI	20-30 g
3-6 LUNI	20-25 g
6-9 LUNI	15-30 g
9-12 LUNI	10-15 g

Monitorizarea greutății copilului este obligatorie în primul an de viață.

Sugarul trebuie cântărit (dezbrăcat) o dată pe săptămână în prima lună de viață, apoi o dată pe lună până la cel puțin până la vârsta de 1 an.

Înălțimea bebelușului

Înălțimea normală a nou-născutului se situează între 46-54 cm., cu o medie de 50 cm. Înălțimea bebelușului variază în funcție de numeroși factori complexi, în special alimentația. În general, ea este de 72 cm la 1 an și de 80 la 2 ani.

CREȘTEREA ÎN ÎNĂLȚIME PE AN

VARSTA	CREȘTEREA ÎN ÎNĂLȚIME/ AN
0- 12 LUNI	25 cm
1-2 ANI	13 cm
2-3 ANI	9 cm
3 ANI - PUBERTATE	5 cm

Unii copii cresc puțin în primii 2-3 ani și compensează întârzierea în anii următori, alții cunosc o explozie de creștere la pubertate.

Înălțimea definitivă este atinsă la 20 ani și depinde de alimentație, factori genetici și de mediul social.

Perimetrul cranian al bebelușului

La naștere, dimensiunea capului reprezintă un sfert din înălțimea bebelușului.

Perimetrul cranian la naștere este de aproximativ de 35,5 cm și va crește foarte mult în primele luni de viață ale copilului.

Craniul sugarului este compus din mai multe oase, mentinute impreuna de suturi. Intre placile osoase se gasesc spatii neosificate, care poarta denumirea de fontanela. Cele doua fontanele (anterioara si posteroara) se vor inchide progresiv la aproximativ 1 an.

Astfel se explica deformatiile care apar uneori in timpul nasterii.

EVOLUTIA PERIMETRULUI CRANIAN DE LA NASTERE PANA LA 1 AN

VARSTA	PERIMETRUL CRANIAN (cm)
NASTERE	35 cm
5 LUNI	41 cm
1 AN	47 cm

Intocmit, As . Rosu Daniela

Data : 10.04.2015

Roscu D.

Verificat M.C. Poiana Constantin

Data : 14.04.2015



DIR. MEDICAL. DR. ROTARU HILDA.

DATA: 14.04.2015.

H

Aprobat, Manager Dr. Toron Mouhammad

Data: 14.04.2015



