



ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

NR:3464/20.04.2015

PROTOCOL PRIVIND RECOLTAREA DE TESTE SANGVINE PENTRU MASURAREA GLICEMIEI PE GLUCOMETRU REVIZIA 1

Rapid, usor de recoltat, folosind o picatura de sange capilar din deget, lobul urechii sau calcaie(bebelusi), testul glicemic este o metoda uzuala de monitorizare a nivelului glucozei din sange la pacientii cu diabet, de screening pentru diabetul mellitus, de depistare a hipoglicemiei neonatale, sau de diagnostic diferential intre coma diabetica si nondiabetica. Proba poate fi luata in spital cat si la domiciliul pacientului.

Materiale necesare:

- manusi
- glucometru portabil
- paduri alcoolizate
- comprese tifon
- bandaj adeziv

Pregatirea echipamentului:

- se va verifica glucometrul si toate accesoriile acestuia(ace, rezerve, banda de citire, baterie etc)

Recoltarea:

- ✓ confirmarea identitatii pacientului(pentru a se evita confuzia si a nu se lua analize la un alt pacient).
- ✓ se comunica pacientului ce i se va face, i se va explica procedura pentru a-i reduce anxietatea si a ne asigura de cooperarea sa, precum si pentru obtinerea consimtamantului.

- ✓ se selecteaza locul punctiei(deget sau lobul urechii pentru adulti, calcaie pentru nou-nascut)
- ✓ se spala mainile bine si se pun manusi
- ✓ daca este necesar, pentru dilatarea capilarelor, pacientul se poate spala pe maini cu apa calda
- ✓ se sterge locul ales pentru punctie cu alcool si apoi se usuca cu o compresa
- ✓ se pregateste glucometrul (se calibreaza si de deschide) si apoi se punctioneaza locul dintr-o singura miscare scurta si rapida
- ✓ dupa punctiune se va evita sa se faca compresie sau sa se "stoarca" locul, pentru a evita amestecarea sangelui capilar cu alte fluide tisulare.
- ✓ se lasa sa curga picatura de sange pe banda pregatita a glucometrului, asigurandu-ne ca este suficienta pentru citirea rezultatului
- ✓ dupa recoltare se mentine compresie pe locul punctiunii pana se opreste sangerarea
- ✓ dupa oprirea sangerarii se aplica un bandaj adeziv.
- ✓ se noteaza rezultatul, data si ora in FOCG.
- ✓ dupa utilizare, glucometrul se dezinfecteaza cu solutie dezinfectanta alcoolica (Isorapid, Zhivahex, etc) aflata in uz ;
- ✓ materialele sanitare utilizate se colecteaza in cutiile de deseuri destinate acestui scop.

Consideratii speciale:

- ⊗ se va evita recoltarea din locuri edematiate, cianotice.
- ⊗ daca pacientul va trebui sa foloseasca acasa glucometrul si sa isi recolteze singur trebuie invatat sa o faca corect, cel mai indicat fiind sa i se ofere si un ghid scris de folosire a glucometrului. De asemenea va trebui sa stie care sunt valorile glicemice anormale pentru care va trebui sa vina la spital.

Întocmit: As.Pr.Badita Madalina

Data: 20.04.2015

Verificat: Director Medical-Dr.Rotaru Hilda

Data: 20.04.2015

Verificat: Manager Calitate-Poiana Constantin

Data: 20.04.2015

Aprobat: Manager-Dr.Toron Mouhannad

Data: 20.04.2015