



SPITALUL ORĂȘENESC Buhuși
Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 2911 din 30-03-2011

Revizia
Exemplarul

Protocol de tratament al enterocolitei la sugari

Diareea sau enterocolita acuta reprezinta o afectiune caracterizata de prezenta mai mult de 3 scaune semiconsistente, moi sau chiar apoase. Diareea poate fi o afectiune usoara, pasagera fara rasunet deosebit asupra organismului, dar neglijata, poate fi o afectiune extrem de severa pana la deces, mai ales la sugari.

Semne si simptome de enterocolita la sugari:

- refuzul alimentatiei, plans necontrolabil, paloare, facies suferind, scaune moi, semiconsistente, cu mucozitati, in situatii mai grave pot aparea scaune cu striuri de sange, intens fetide.
- febra moderata sau febra inalta >39 grade Celsius
- varsaturi - a caror prezenta anunta o forma de evolutie mai severa si impun prezentarea de urgenta la medic.
- eruptii tegumentare sub forma de exantem difuz micropapulos (pana la eruptii cu elemente de forme si marimi diferite, cu extensie la nivelul intregului corp). Eruptia poate dura de la cateva ore pana la 2-3 zile.

-in cazul faringoenterovirozelor poate aparea si exantemul faringian cu leziuni care merg de la picheteu hemoragic pana la leziuni ulcerate, la nivelul retrofaringelui.

Diagnosticul pozitiv in enterocolita se pune pe aspectul clinic al bolii si pe rezultatele paraclinice si se recomanda:

-examenul clinic complet

-coprocultura, coprocitograma si examenul coproparazitologic

-hemograma completa

-sumar de urina

Tratamentul enterocolitei:

a) profilactic:

-respectarea regulilor stricte de igiena personala, a apei si a alimentatiei

-vaccinarea antiRotavirus

b) curativ:

-regim igienico-dietetic

-tratamentul medicamentos

La sugarii alimentati la san, se va mentine alimentatia exclusiv la san si se va urmari regimul mamei, se administreaza probiotice si la mama si la sugar.

La sugarii alimentati mixt-se va mentine sanul si se va administra un preparat dietetic de completare, o formula fara lactoza sau partial delactozata in functie de numarul de scaune pe care le prezinta si aspectul lor.

In situatia in care sugarul refuza sanul, se recomanda (max 2-4 ore) sa tentati rehidratarea progresiva, blanda, cu solutie de apa fiarta si racita, in care s-au dizolvat saruri de rehidratare orala (Gesol, Humana Electrolyt), ceai de menta indulcit cu glucoza praf 5% (1 lingurita la 100 ml de ceai). Se administreaza cantitati mici, la 10 minute cate 5 ml (1 lingurita) fara a se forta sugarul, pentru ca exista riscul ca varsaturile sa se intensifice si sa se deshidrateze rapid.

La sugarii mai mari se poate da si alte preparate dietetice cum ar fi: supa de morcov, orez pasat, branza de vaci preparata in casa, mar copt, banana, cereale special concepute pt copiii cu diaree avand ca baza orezul, ceai de afine sau menta indulcit cu glucoza 5%.

Tratament medicamentos in diaree:

1. Dieta-reprezinta principalul medicament intr-o diaree virala
2. Agentii de rehidratare orala-Humana Electrolyt/Gesol/Floridral
3. Prebioticele si Probioticele-refac flora intestinala
4. Absorbanti intestinali-Smecta-curata intestinul prin continutul de saruri insolubile de aluminiu si magneziu
5. Microorganisme antidiareice-Enterol
6. Hidrasec-rol antidiareic alaturi de celelalte remedii
7. Tratament antitermic

Intocmit, As Rosu Daniela

Data: 26.08.2015.

Verificat M.C. Poiana Constantin

Data: 27.08.2015

CONSTANTIN POIANA
MANAGER
DE CALITATE

DIRECTOR MEDICAL
DR. ROTARU HELBA

Aprobat, Manager, Toron Mouhannad

Data: 27-08-2015.

