



ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC Buhuși

Buhuși-605100, str. Văloagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010 ; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001.: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

NR. 2103 din 3-03. 2015



SPALAREA SI DEZINFECTIA TETINELOR SI BIBEROANELOR

REVIZIA 1

În primele 12 luni de viață este foarte important ca biberoanele și tetinele să fie foarte bine dezinfectate și sterilizate, deoarece sistemul imunitar al bebelușului nu este suficient dezvoltat.

Mediul în care trăim este adesea populat cu diferiți microbi pe care nu-i vedem, dar care pot produce multe boli ale aparatului digestiv sau ale cavității bucale.

Factorii patogeni există și se înmulțesc în aer, se transmit de cele mai multe ori prin igiena defectuoasă, de aceea trebuie spălate, dezinfectate și sterilizate tetinele și biberoanele înainte de a alimenta sugarul.

După hrănirea sugarului (a nu se hrăni niciodată sugarul cu laptele rămas deoarece există riscul intoxicației din cauza microorganismelor ce se formează în resturile de hrană) se spală tetina și biberonul cu detergent de vase, de preferat cu ajutorul periiilor pentru a nu rămâne resturi, după care se dezinfectează timp de 30 minute, iar apoi se clătesc bine și se pun la scurs.

Este foarte importantă spălarea, nu numai clătirea biberonului, fiindcă chiar și particulele de hrană pot duce la apariția unor bacterii foarte daunătoare.

Sterilizarea biberoanelor și tetinelor se efectuează la autoclav.

Înainte de orice ciclu de sterilizare se curăță cosul autoclavului.

Temperatura de sterilizare este de 125 °C.

Dupa spalarea dezinfectia si clatirea biberoanelor si tetinelor, se pun la scurs dupa care se introduc in autoclav , se seteaza pentru un ciclu de sterilizare (15 min.) , iar sistemul de inchidere al autoclavului blocheaza deschiderea usii pana la finalizarea ciclului.

Este foarte importanta sterilizarea deoarece sistemul imunitar al bebelusului nu este sufficient de dezvoltat si pot aparea alte imbolnaviri.

Intocmit , As. Rosu Daniela

Data : 2.03.2015

Verificat , C.P.C.I.N.

M.C. Poiana C-tin

Data : 3.03.2015

Aprobat , Manager Dr. Toron Mouhannad

Data : 3.03.2015

CONSTANTIN POIANA
MANAGER
DE CALITATE

