

ISO 9001
REGISTERED FIRM

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Buhuși-605100, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău Nr. Autoriz. funcț.: 102/01. 09. 2010; C.I.F. 4187271
Certificat I.S.O. 9001: Numar certificat 56336/A0001/UK/RO
Tel: 0234-262220 - centrala; Tel/Fax: 0234-261560 - secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; www.spitalbuhusi.ro

Nr. 5573 / 22-04-2015

Tratament în astm bronsic și BPOC

Revizia
Exemplarul

Rev. 1

Mulți dintre pacienții astmatici au un control inadecvat al bolii și nu ating acel deziderat de astm total controlat cu doze mici sau moderate de corticoizi topici. Sigur că o opțiune ar putea fi adăugarea de antileucotriene, beta-2 adrenergic de lungă durată, sau creșterea dozelor de corticoid inhalator. După ce FDA a pus în discuție siguranța beta-2 adrenergicelor de lungă durată în astm, în dorința de a găsi strategii de minimizare a efectelor acestora în această boală și datorită heterogenității pacienților cu astm, s-au căutat și alte alternative de agenți pentru controlul bolii. La momentul acela, deși se lăua în calcul grupa de anticolinergice, un raport Cochrane arăta că nu se justifică introducerea de rutină a acestei grupe de agenți medicamentoși în terapia antiastmatică (totul fiind bazat pe utilizarea ipratropiumului), iar despre tiotropium se spunea că nusunt date. Astfel, tiotropiumul, care era aprobat din 2004 pentru BPOC, nu era cu același regim pentru astmul bronșic Adăugarea de tiotropium în monoadministrare zilnică la o doză crescută de corticoizi (>800 mcg de budesonid) plus beta-2 adrenergic de lungă durată a ameliorat semnificativ funcția pulmonară pe 24 de ore la cei cu forme severe de astm inadecvat controlate. Spiriva (tiotropium) Respimat în tratamentul astmului bronșic a fost acceptată de către autoritățile de reglementare din UE. Spiriva Respimat este indicat ca tratament complementar bronhodilatator de întreținere pentru pacienții adulți cu astm, care sunt tratați cu o combinație de întreținere pe bază de corticosteroizi inhalatori ($\geq 800\mu\text{g}$ budesonidă/zi sau echivalent) și beta2 agonisti cu durată lungă de acțiune, și care au experimentat una sau mai multe exacerbări severe în anul precedent.


Noua indicație pentru Spiriva® Respimat® în tratamentul astmului este bazată pe rezultatele programului clinic de Fază III UniTinA-asthma®, care investighează pacienții adulți cu astm care continuă să prezinte simptome în ciuda terapiei cu ICS sau ICS/LABA .

Spiriva® Respimat® este un tratament de întreținere inhalator anticolinergic cu acțiune de lungă durată. Acționează prin deschiderea căilor respiratorii îngustate și menținerea lor în acest stadiu timp de 24 de ore. În prezent nu există alți bronhodilatatori anticolinergici cu acțiune de lungă durată indicați pentru tratamentul astmului. Spiriva® Respimat® este deja aprobat pentru tratamentul bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC), susținut de datele complete rezultate în urma a peste 230 de studii clinice care au investigat efectele tiotropium asupra BPOC. Dozele inhalatorii recomandate sunt de 2,5 micrograme de două ori de preferat dimineața, aceeași doză fiind indicată și în sdr.overlap astm și BPOC precum și în BPOC în special forme severe.

Întocmit: Dr. Pascariu Luminita

Verificat: Dir. Med. Dr. Rotaru Hilda

Aprobat: Manager General Dr. Toron Mohammad



Data: 21-04-2015

Data: 26-04-2015

Data: 22-04-2015

